

La **coqueluche** est une maladie infectieuse pouvant être **sévère**, notamment chez les très jeunes enfants qui ne sont pas encore vaccinés (avant 3 mois)

Il existe un **vaccin efficace**

**Sans danger** chez la femme enceinte ou allaitante qui permet chez le nouveau-né :

- de diviser par 4 leur risque de coqueluche
- de réduire de moitié le nombre d'**hospitalisations**
- de réduire de 95% le nombre de **décès**

La Haute Autorité de Santé **RECOMMANDE LA VACCINATION CONTRE LA COQUELUCHE :**



## CHEZ LA FEMME ENCEINTE

**A chaque grossesse**

A partir du 2<sup>ème</sup> trimestre  
en privilégiant la période **20-36SA**  
Avec un vaccin tétravalent (dTcaP)

Elle augmente le transfert des anticorps maternels au fœtus

Et assure ainsi une protection optimale du nouveau-né dès la naissance

## CHEZ LA MÈRE QUI N'A PAS ÉTÉ VACCINÉE PENDANT LA GROSSESSE

en post-partum  
avant la sortie de maternité

La vaccination est compatible avec l'allaitement



## CHEZ L'ENTOURAGE PROCHE SI LA MÈRE N'A PAS ÉTÉ VACCINÉE PENDANT LA GROSSESSE

ou accouche moins d'un mois après le vaccin

**Pour en Savoir plus:**



[www.grig.fr](http://www.grig.fr)



**Recommandations de la HAS:**

[https://www.has-sante.fr/jcms/p\\_3084228/fr/recommandation-vaccinale-contre-la-coqueluche-chez-la-femme-enceinte](https://www.has-sante.fr/jcms/p_3084228/fr/recommandation-vaccinale-contre-la-coqueluche-chez-la-femme-enceinte)



Chaine Youtube du GRIG